

Bolus
Relpain Vet
Meloxicam BP 100 mg

Only for the use of animals

Composition

Each bolus contains Meloxicam BP 100 mg.

Pharmacology

Meloxicam is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the oxicam family. It acts by inhibiting prostaglandin synthesis, thereby exerting anti-inflammatory, anti-exudative, analgesic and antipyretic properties. Meloxicam has anti-endotoxic properties too.

Indication

Cattle: Inflammation, pain, fever, lameness, dehorning & castration. It is also used as supportive therapy in acute respiratory infection, diarrhea, acute mastitis, post operation etc.

Dog: Osteoarthritis.

Cat: Orthopedic surgery, ovariohysterectomy and castration.

Pig: Inflammation & locomotor disorders.

Dosage & Administration

Cattle: 1 bolus/100 kg body weight (1 mg/kg) orally as single dose.

Dog: 0.2 mg/kg body weight orally single dose for 1 day followed by 0.1 mg/kg from 2nd day.

Pig: 0.1 mg/kg body weight orally daily for 2 weeks

Or as directed by the veterinary physician.

Contraindications

Contraindicated in animals less than six weeks old, animals hypersensitive to meloxicam, impaired renal, hepatic or cardiac function.

Warnings & precautions

Repeated use of Meloxicam in cat may cause kidney failure. So precautions should be taken while using in cat repeatedly.

Side effects

Common: Prolong use may cause gastrointestinal lesions, inappetence, vomiting & diarrhea.

Rare: Not known.

Use in pregnancy & lactation

May be used in pregnant & lactating animals. However, risk & necessity should be considered during administration of medicine in pregnant animals.

Drug interactions

With Medicine: May cause increased likelihood of bleeding if use in conjunction with corticosteroids, heparin, warfarin, aspirin, flunixin & phenylbutazone.

With food and others: Not Known.

Withdrawal periods

Meat: Should not be consumed up to 15 days after using this drug.

Milk: Should not be consumed up to 5 days after using this drug.

Storage

Store below 30°C temperature, protected from light and in a dry place. Keep all medicines out of reach of children.

Packing

Each box contains 10x4 boli in blister pack.

Manufactured by:
Navana Pharmaceuticals Ltd.
Rupshi, Rupganj, Narayanganj, Bangladesh



NCLT0728_03-22_00

বোলাস

রেলপেইন ভেট

মেলোক্সিক্যাম বিপি ১০০ মি. গ্রা.

শুধুমাত্র প্রাণি চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য

উপাদান

প্রতিটি বোলাস এ রয়েছে মেলোক্সিক্যাম বিপি ১০০ মি. গ্রা.।

ফার্মাকোলজি

মেলোক্সিক্যাম অক্সিক্যাম পরিবারের একটি নন-স্টেরয়ডাল অ্যান্টি-ইনফ্লামটরি ড্রাগ (NSAID)। এটি প্রোস্টাগ্যান্ডিন সংশ্লেষণে বাধা প্রদান করে যার ফলে অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি, অ্যান্টি-অক্সিজেনেটিক, অ্যানালজেসিক এবং অ্যান্টিপাইরেটিক হিসাবে কাজ করে। মেলোক্সিক্যাম এর অ্যান্টি-এন্ডোটক্সিক বৈশিষ্ট্যও রয়েছে।

নির্দেশনা

গোরু: প্রদাহ, ব্যথা, জ্বর, খোড়ানো, শিং কাটা ও খোঁজাকরণ। এটি তীব্র শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, ডায়রিয়া, ম্যাস্টাইটিস, শল্য চিকিৎসা পরবর্তীতে সহায়ক চিকিৎসা হিসাবে নির্দেশিত।

কুকুর: অস্টিওআরথ্রাইটিস।

বিড়াল: অর্থোপেডিক সার্জারি, ওভারিওহিস্টারেকটমি এবং খোঁজাকরণ।

শুকর: প্রদাহ ও খোঁড়ানো।

প্রয়োগমাত্রা ও প্রয়োগবিধি

গোরু: ১ বোলাস/১০০ কেজি দৈনিক ওজনের জন্য (১ মি. গ্রা./কেজি) একবার মুখে খাওয়াতে হবে।

কুকুর: ০.২ মি. গ্রা./কেজি দৈনিক ওজনের জন্য একবার মুখে খাওয়াতে হবে এবং পরবর্তীতে ০.১ মি. গ্রা./কেজি দৈনিক ওজনের জন্য মুখে খাওয়াতে হবে।

শুকর: ০.১ মি. গ্রা./কেজি দৈনিক ওজনের জন্য দিনে ১ বার মুখে খাওয়াতে হবে দুই সপ্তাহ।

অথবা রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

প্রতিনির্দেশনা

ছয় সপ্তাহের কম বয়সী প্রাণির ক্ষেত্রে, মেলোক্সিক্যাম এর প্রতি সংবেদনশীল প্রাণি, বৃদ্ধ, যত্ন ও হৃদপিণ্ডের অকার্যকারিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

সাবধানতা ও সতর্কতা

বিড়ালের ক্ষেত্রে মেলোক্সিক্যাম এর পুনঃপুনঃ ব্যবহার বৃদ্ধ অকার্যকর হতে পারে। তাই বিড়ালের ক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ ব্যবহারে সতর্ক থাকা উচিত।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

সাধারণ: মেলোক্সিক্যাম এর দীর্ঘ ব্যবহারে পরিপাকতন্ত্রে ক্ষত, খাদ্য গ্রহণে অকলি, বমি এবং ডায়রিয়া হতে পারে।

কিরল: জানা যায়নি।

গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী প্রাণিতে ব্যবহার

গর্ভবতী এবং দুগ্ধবতী প্রাণিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সুবিধা/ঝুঁকি বিবেচনা করে গর্ভবতী প্রাণিতে ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

অন্যান্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া

ঔষধের সাথে: কর্টিকোস্টেরয়েডস, হেপারিন, ওয়ারফারিন, অ্যাসপিরিন, ফ্লুনিজিন এবং ফিনাইলবিউটাজোন এর সাথে একত্রে ব্যবহার করা হলে রক্তপাতের সম্ভাবনা বাড়তে পারে।

খাবার এবং অন্যকিছুর সাথে: জানা যায়নি।

প্রত্যাহার কাল

মাংস: এই ঔষধ ব্যবহারের পর ১৫ দিন পর্যন্ত মাংস খাওয়া উচিত নয়।

দুধ: এই ঔষধ ব্যবহারের পর ৫ দিন পর্যন্ত দুধ খাওয়া উচিত নয়।

সংরক্ষণ

৩০°সে. তাপমাত্রার নিচে, আলো থেকে দূরে ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

প্রতিটি বক্সে আছে ১০x৪ টি বোলাস ব্লিস্টার প্যাক।

পণ্ডিতকারক:

নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

রূপসী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ



ভেটেরিনারি ডিভিশন