

Lulider Cream

Luliconazole INN 1%

Composition:

Lulider Cream: Each gram cream contains Luliconazole INN 10 mg.

Pharmacology:

Exact mechanism of action against dermatophytes is unknown, luliconazole appears to inhibit ergosterol synthesis by inhibiting the enzyme lanosterol demethylase. Inhibition of this enzyme's activity by azoles results in decreased amounts of ergosterol, a constituent of fungal cell membranes and a corresponding accumulation of lanosterol.

Indication:

Lulider Cream is indicated for the topical treatment of interdigital tinea pedis, tinea cruris and tinea corporis, in patients 18 years of age and older.

Dose & Administration:

Tinea pedis: A thin layer of cream, 1% should be applied to the affected area and approximately 1 inch of the immediate surrounding area(s) once daily for two weeks or as directed by the physician.

Tinea cruris or tinea corporis: A thin layer of cream, 1% should be applied to the affected area and approximately 1 inch of the immediate surrounding area(s) once daily for one week or **as directed by the physician**.

Contraindication:

No information is available.

Warning and Precaution:

Side Effects:

The most common adverse reaction (<1%) is application site reactions.

Use in Pregnancy and Lactation:

Pregnancy Category C.

Use in Children and Adolescents:

The safety and effectiveness of **Lulider Cream**, 1% in pediatric patients have not been established. The number of pediatric patients \geq 12 years of age were too small to adequately assess safety and efficacy.

Drug Interaction:

No information is available.

Overdose:

Storage:

Store below 30°C., away from light and in a dry place. Keep out of the reach of children.

Packing:

Lulider Cream: Each Pack has a laminated tube containing 10 g cream and an insert.

Lulider Cream: Each Pack has a laminated tube containing 30 g cream and an insert.

Manufactured by :

Navana Pharmaceuticals Ltd.
Rupshi, Narayanganj, Bangladesh.

NCLT0633_02-21_01

 **NAVANA PHARMA**
JAHURUL ISLAM COMPANY

লুলিডার ক্রীম

লুলিকোনাজল আইএনএন ১%

উপাদান:

লুলিডার ক্রীম: প্রতি গ্রাম ক্রীমে রয়েছে লুলিকোনাজল আইএনএন ১০ মি.গ্রা.।

ফার্মাকোলজী:

ছত্রাকের বিরুদ্ধে লুলিকোনাজলের কার্য পদ্ধতি জানা যায়নি। লুলিকোনাজল ল্যানোস্টেরল ডিমিথিলেস এনজাইমের কার্যকারিতায় বাধা প্রদানের মাধ্যমে আরগোস্টেরল তৈরীতে বাধা দেয়। এই এনজাইমের কার্যকারিতা বাধা প্রদানের বিশেষ ফলস্বরূপ আরগোস্টেরলের পরিমাণ কমে যায়, যা একই সাথে ল্যানোস্টেরল এর জমা হওয়া কমিয়ে দেয়।

নির্দেশনা:

লুলিডার ক্রীম টিনিয়া পেডিস, টিনিয়া ক্রুরিস এবং টিনিয়া করপোরিস জাতীয় ত্বকীয় প্রদাহ সংক্রমণে নির্দেশিত। ১৮ বছর বয়সী অথবা এর উপরের রোগীদের জন্য।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:

টিনিয়া পেডিস: সামান্য পরিমাণে ক্রীম ত্বকের আক্রান্ত স্থানে এবং ১ ইঞ্চি মার্জিন সহ ক্রীম আক্রান্ত স্থানের চারপাশে দিনে একবার, দুই সপ্তাহ ব্যবহার করতে হবে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য।

টিনিয়া ক্রুরিস এবং টিনিয়া করপোরিস: সামান্য পরিমাণে ক্রীম ত্বকের আক্রান্ত স্থানে এবং ১ ইঞ্চি মার্জিন সহ ক্রীম আক্রান্ত স্থানের চারপাশে দিনে একবার, এক সপ্তাহ ব্যবহার করতে হবে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য।

প্রতিনির্দেশনা:

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

সাবধানতা ও সতর্কতা:

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:

বিরূপ প্রভাবের ফলে (< ১%) প্রয়োগের স্থানে প্রক্রিয়া হতে পারে।

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন ব্যবহার:

প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি সি ড্রাগ।

শিশু ও বয়ঃসন্ধিকালীন ব্যবহার:

লুলিডার ক্রীম-এর নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা শিশুদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১২ বছর এবং তদুর্ধ্ব বয়সী শিশুরোগীদের সংখ্যা খুব কম থাকায় নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা পর্যাপ্তভাবে নির্ণয় করা যায়নি।

অন্য ওষুধের সাথে ক্রিয়া:

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

অতিমাত্রা:

সংরক্ষণ:

৩০°সে. তাপমাত্রার নিচে, আলো থেকে দূরে ও শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।।

মোড়ক:

লুলিডার ক্রীম: প্রতি প্যাকে রয়েছে ১০ গ্রাম ক্রীমের একটি লেমিনেটেড টিউব এবং একটি নির্দেশিকা।

লুলিডার ক্রীম: প্রতি প্যাকে রয়েছে ৩০ গ্রাম ক্রীমের একটি লেমিনেটেড টিউব এবং একটি নির্দেশিকা।

প্রস্তুতকারক:

নাবানা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ
রূপসী, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

 **নাবানা ফার্মা**
জাহুরুল ইসলাম কোম্পানী