

Freescab

Spinosad 0.9%

Topical Suspension

Composition

Freescab Topical Suspension: Each ml of topical suspension contains Spinosad INN 9 mg.

Pharmacology

Spinosad Topical Suspension 0.9% liquefies at body temperature. Spinosad causes neuronal excitation in insects. After periods of hyperexcitation, lice and mites become paralyzed and die.

Indication

Scabies Infestations: Spinosad Topical Suspension is a scabicide indicated for the topical treatment of scabies infestations in adult and paediatric patients 4 years of age and older.

Head Lice Infestations: Spinosad Topical Suspension is a pediculicide indicated for the topical treatment of head lice infestations in adult and paediatric patients 6 months of age and older.

Dosage & Administration

For topical use only. Not for oral, ophthalmic, or intravaginal use.

Treatment of Scabies Infestations:

- The bottle should be shaken well before use
- The medication should be thoroughly rubbed into the entire body from the neck down to the soles of the feet
- Patients with balding scalp should also apply the medication to the scalp, hairline, temples, and forehead
- Sufficient time should be allowed for the medication to absorb into the skin and dry for 10 minutes before dressing
- Bathing should be avoided for at least 6 hours after application

Treatment of Head Lice Infestations:

- The bottle should be shaken well before use
- The medicine should be applied thoroughly so that the scalp is completely covered. Then the medication should be applied to dry hair
- After 10 minutes, the hair should be rinsed with warm water
- If live lice are observed 7 days after the first treatment, the treatment should be repeated or as directed by the physician.

Contraindication

No information is available.

Warnings & Precautions

Benzyl Alcohol Toxicity: Not recommended in infants below the age of 6 months; potential for increased systemic absorption.

Side Effects

Most common adverse reactions for:

- Scabies treatment (>1%) are application site irritation and dry skin
- Lice treatment (>1%) are application site erythema and ocular erythema

Use in Pregnancy & Lactation

Pregnancy: Pregnancy category B.

Lactation: Breastfeeding is not expected to result in the exposure of the child to Spinosad. Breastfeeding women should remove Spinosad Topical Suspension from the breast with soap and water before breastfeeding.

Use in Children & Adolescents

Scabies Infestation: The safety and effectiveness of Spinosad Topical Suspension have not been established in pediatric patients less than 4 years of age with scabies infestation.

Head Lice Infestation: The safety and effectiveness of Spinosad Topical Suspension for the topical treatment of head lice infestation have been established in pediatric patients 6 months of age and older.

Drug Interactions

No information is available.

Overdosage

No specific antidotes for Spinosad overdosage are known. If accidentally ingested, seek medical attention immediately.

Storage

Store below 25°C, protected from light & in a dry place. Keep all medicines out of the reach of children.

Packing

Freescab Topical Suspension: Each box contains 100 ml topical suspension in the HDPE bottle and an insert.

ফ্রিস্কাব

স্পিনোসেড ০.৯%

টপিক্যাল সাসপেনশন

উপাদান

ফ্রিস্কাব টপিক্যাল সাসপেনশন: প্রতি মি.লি. টপিক্যাল সাসপেনশনে রয়েছে স্পিনোসেড আইএনএন ৯ মি.গ্রা.।

ফার্মাকোলজি

স্পিনোসেড ০.৯% টপিক্যাল সাসপেনশন শরীরের তাপমাত্রায় তরল হয়ে যায়। স্পিনোসেড পোকামাকড়ের (যেমন: উকুন ও মাইটের) স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে, যার ফলে তারা প্যারালাইজড হয়ে মারা যায়।

নির্দেশনা

স্ক্যাবিস সংক্রমণ: স্পিনোসেড টপিক্যাল সাসপেনশন একটি স্ক্যাবিসাইড যা ৪ বছর ও তার বেশি বয়সী প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু রোগীর স্ক্যাবিস সংক্রমণ চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাথার উকুনের সংক্রমণ: স্পিনোসেড টপিক্যাল সাসপেনশন একটি পেডিকুলিসাইড যা ৬ মাস ও তার বেশি বয়সী প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু রোগীর মাথার উকুন সংক্রমণ চিকিৎসায় নির্দেশিত।

সেবনামাত্রা ও বিধি

গুণুমাত্রা ভুলের জন্য ব্যবহার্য। মুখে, চোখে বা যোনিপথে ব্যবহার করা যাবে না।

স্ক্যাবিস সংক্রমণের চিকিৎসা:

- ব্যবহারের পূর্বে বোতলটি ভালো করে কাঁকিয়ে নিতে হবে
- গুণুমাত্রা ভালোভাবে ঘষে ঘষে গলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত পুরো শরীরে লাগাতে হবে
- যাদের মাথার চুল কম বা টাক রয়েছে, তাদের মাথার তালু, চুলের গোড়ায়, কপাল ও কানের পাশের অংশেও লাগাতে হবে।
- ভুলে শোষিত হতে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে এবং পোশাক পরিধান করার আগে ১০ মিনিট শুকাতে হবে
- ভুলে ব্যবহারের ৬ ঘন্টার মধ্যে গোসল করা যাবে না

মাথার উকুন সংক্রমণের চিকিৎসা:

- ব্যবহারের পূর্বে বোতল ভালো করে কাঁকিয়ে নিতে হবে
- স্ক্যাল্পে গুণুমাত্রা এমনিভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে এটি সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয়। তারপর শুকনো চুলে প্রয়োগ করতে হবে
- ১০ মিনিট পর চুল গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে
- প্রথম চিকিৎসার ৭ দিন পর যদি জীবিত উকুন দেখা যায়, তবে চিকিৎসা পুনরাবৃত্তি করতে হবে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

প্রতিনির্দেশনা

কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

সাবধানতা এবং সতর্কতা

বেনজাইল অ্যালকোহল টক্সিসিটি: ৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের জন্য ব্যবহার করা উচিত না, কারণ এতে শরীরে বেশি পরিমাণে শোষিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

সবচেয়ে সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:

- স্ক্যাবিস চিকিৎসার ক্ষেত্রে (>১%) অ্যাপ্রিকেশন সাইটে জ্বালাপোড়া এবং ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া
- মাথার উকুন চিকিৎসার ক্ষেত্রে (>১%) অ্যাপ্রিকেশন সাইটে লালচেতা বা এবং চোখে লালচেতা

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে

গর্ভাবস্থায়: প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি বি।

স্তন্যদানকালে: স্পিনোসেড টপিক্যাল সাসপেনশন ব্যবহারের সময় শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ালে শিশুটির স্পিনোসেডের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা নেই বলে ধরা হয়। তবুও, বুকের দুধ খাওয়ান এমন মহিলাদের স্তন্যদানের পূর্বে সাবান ও পানি দিয়ে স্তন থেকে গুণুমাত্রা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

শিশু ও বয়ঃসন্ধিকালীন ব্যবহার

স্ক্যাবিস সংক্রমণ: ৪ বছরের কম বয়সী শিশু রোগীর মধ্যে স্ক্যাবিস সংক্রমণ চিকিৎসায় স্পিনোসেড টপিক্যাল সাসপেনশনের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

মাথার উকুন সংক্রমণ: ৬ মাস ও তার বেশি বয়সী শিশু রোগীর মধ্যে মাথার উকুন সংক্রমণ চিকিৎসায় স্পিনোসেড টপিক্যাল সাসপেনশনের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অন্য গুণুদের সাথে প্রতিক্রিয়া

কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

অতিমাত্রা

স্পিনোসেড ওভারডোজের জন্য কোনো নির্দিষ্ট অ্যান্টিডোট নেই। ভুলবশত মুখে খাওয়া হলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

সংরক্ষণ

২৫°সে. তাপমাত্রার নিচে, আলো থেকে দূরে ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। সকল গুণু শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

মোড়ক

ফ্রিস্কাব টপিক্যাল সাসপেনশন: প্রতি বাক্সে রয়েছে ১০০ মি.লি. টপিক্যাল সাসপেনশন এইচডিপিই বোতলে এবং একটি নির্দেশিকা।

প্রস্তুতকারক:

নাবানা ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাইভেট লিমিটেড

রূপসী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

 **নাবানা ফার্মা**