

Size : 72 x 180 mm

(2 color, 65 gsm offset)

Oral Solution

# Navafen Vet

Florfenicol INN

Only for the use of animals

## Composition

Each ml oral solution contains Florfenicol INN 200 mg.

## Pharmacology

Florfenicol is a synthetic, broad-spectrum antibiotic active against many Gram-negative and Gram-positive bacteria. It acts by binding to the 50s ribosomal subunit and inhibiting bacterial protein synthesis.

## Indication

Florfenicol is indicated for the treatment of respiratory tract and gastrointestinal tract infections in poultry such as Colibacillosis, Salmonellosis, Fowl Cholera, Pneumonia etc.

## Dosage & Administration

Poultry: 1 ml/2 liter drinking water (15-20 mg/kg body weight) for 3-5 days.

Or as directed by the registered veterinary physician.

## Contraindications

Contraindicated in animals hypersensitive to Florfenicol.

## Warnings & precautions

Should not be used during vaccination.

## Side effects

Common: A decrease in food and water consumption and transient softening of the faeces, kidney damage or diarrhoea may occur during the treatment period.

Rare: None.

## Drug interactions

**With Medicine:** Florfenicol could antagonize the bactericidal activity of the Penicillins and Aminoglycosides.

**With food and others:** Not Known.

## Withdrawal periods

**Meat:** Should not be consumed up to 5 days after using this drug.

**Egg:** Not known.

## Storage

Store below 30°C temperature, protected from light and in a dry place. Keep all medicines out of reach of children. Do not keep in refrigerator.

## Packing

100 ml and 500 ml bottle.

Manufactured by:  
**Navana Pharmaceuticals Ltd.**  
Rupshi, Rupganj, Narayanganj, Bangladesh  
NCLT0771\_10-22\_00



ওরাল সলিউশন

# নাভাফেন ভেট

ফ্লোরফেনিকল আইএনএন

ওষুধের প্রাণি চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য

## উপাদান

প্রতি মি.লি. ওরাল সলিউশনে রয়েছে ফ্লোরফেনিকল আইএনএন ২০০ মি.গ্রা.।

## ফার্মাকোলজি

ফ্লোরফেনিকল একটি সিনথেটিক, ব্রড-স্পেকট্রাম এন্টিবায়োটিক যা বিভিন্ন প্রকার গ্রাম-নেগেটিভ ও গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকারিতা প্রদর্শন করে। এটি ব্যাকটেরিয়ার ৫০এস রাইবোসোমাল সাবইউনিটের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন সংশ্লেষণে বাধা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে থাকে।

## নির্দেশনা

ফ্লোরফেনিকল পোস্তির শ্বাসতন্ত্র ও পরিপাকতন্ত্রের রোগ যেমন- কলিব্যাসিলোসিস, সালমোনেলোসিস, ফাউল কলেরা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

## প্রয়োগমাত্রা ও প্রয়োগবিধি

পোস্তি: ১ মি.লি./২ লিটার খাবার পানিতে (১৫-২০ মি.গ্রা./কেজি দৈনিক ওজন) ৩-৫ দিন।

অথবা রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

## প্রতিনির্দেশনা

ফ্লোরফেনিকল এর প্রতিসংবেদনশীল প্রাণির ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

## সাবধানতা ও সতর্কতা

ভ্যাকসিনেশন চলাকালীন সময় ব্যবহার করা উচিত নয়।

## পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

সাধারণ: চিকিৎসা চলাকালীন খাবার ও পানি গ্রহণ কিছুটা কমে যেতে পারে এবং সাময়িক পায়খানা নরম, বৃদ্ধ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত বা ডায়রিয়া হতে পারে।

বিরল: নেই।

## অন্যান্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া

ঔষধের সাথে: ফ্লোরফেনিকল, পেনিসিলিন ও অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইডস

এর কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

খাবার এবং অন্যকিছুর সাথে: জানা যায়নি।

## প্রত্যাহার কাল

মাংস: এই ঔষধ ব্যবহারের পর ৫ দিন পর্যন্ত মাংস খাওয়া উচিত নয়।

ডিম: জানা যায়নি।

## সংরক্ষণ

৩০°সে. তাপমাত্রার নিচে, আলো থেকে দূরে ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। সর্ব

ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। রেফ্রিজারেটরে রাখা যাবে না।

## সরবরাহ

১০০ মি.লি. ও ৫০০ মি.লি. বোতল।

প্রস্তুতকারক:  
**নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ**  
রূপসী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

