

Size: 94 x 205 mm



Only for use in animal/poultry feed

#### Composition

Each ml contains

Vitamin B <sub>1</sub>	5.0	mg
Vitamin B <sub>2</sub>	2.0	mg
Vitamin B <sub>6</sub>	2.0	mg
Vitamin B <sub>12</sub>	0.01	mg
D-Panthenol	11.0	mg
Nicotinamide	60.0	mg
Inositol	1.0	mg
Choline Chloride	50.0	mg
Folic Acid	0.3	mg
DL-Methionine	50.0	mg

#### Description

The liver plays vital role in the body. As commercial birds process a huge amount of feed, they need animals liver tonic to keep liver healthy & effective. This organ plays major role in digestion, metabolism & utilization of nutrients. But liver is endangered by microbial & chemical toxins which may cause varying degree damage to liver & its function which results poor health & production.

#### Function

- Stimulates hepatic cells to secrete digestive enzymes
- Eliminates & deactivate toxins
- Regenerates liver tissues
- Restores the normal functions of liver

#### Indications

- Hepatic disorders & disease
- Fatty liver syndrome
- Mycotoxicosis
- Parasitic diseases
- Diarrhoea/Constipation
- Indigestion
- Poor FCR

#### Dosage & Administration

Poultry: 1 - 2 ml / L drinking water daily for 3-5 days

Cattle, Horse: 20 - 50 ml / animal for 5 days

Calves, Sheep, Goat: 5 - 10 ml / animal for 5 days

Fish & Shrimp: 5 ml / kg feed

Or as directed by the registered Veterinary physician.

#### Side effects

No side effects was observed at recommended dose.

#### Withdrawal period

Meat, Milk & Eggs: 0 (Zero) days.

#### Storage

Store below 30°C temperature, protected from light and in a dry place. Keep out of reach of children.

#### Packing

25 L Drum.

NOLT0816.01-22.00

Manufactured by:  
**POLYMIX B.V. HOLLAND**

Marketed by:  
**NAVANA PHARMA**  
Veterinary Division  
Rupshi, Rupganj, Narayanganj, Bangladesh

 NAVANA PHARMA  
Veterinary Division



শুধুমাত্র প্রাণি/পোল্ট্রি খাদ্যে ব্যবহারের জন্য

#### উপাদান

প্রতি মি.লি. নাভাটন ভেট এ আছে

ভিটামিন বি১	৫.০	মি.গ্রা.
ভিটামিন বি২	২.০	মি.গ্রা.
ভিটামিন বি৩	২.০	মি.গ্রা.
ভিটামিন বি১২	০.০১	মি.গ্রা.
ডি-প্যানথেনল	১১.০	মি.গ্রা.
নিকোটিনামিড	৬০.০	মি.গ্রা.
ইসোসিটল	১.০	মি.গ্রা.
কোলিন ক্রোরাইড	৫০.০	মি.গ্রা.
ফলিক এসিড	০.৩	মি.গ্রা.
ডি-এল মিথওনিন	৫০.০	মি.গ্রা.

#### বৈশিষ্ট্য

- নাভাটন ভেট লিভারের বিলিয়ারী কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পর্যাপ্ত পিতুরস (Bile) নিষ্পত্তির কারণে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট মেটাবলিউম-এ সহায়তা করে
- শরীরে বিদমান এনজাইম সমূহের কার্যকারিতা বাড়িয়ে লিভারের বিষমুক্তকরণ (Detoxification) ক্ষমতা ত্বরিত করে
- পুনিষ উপাদান সমূহের মধ্যমে বিন্যাসের মাধ্যমে দৈহিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে

#### ব্যবহার

- আফলাট্রিনিয়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লিভারের কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে
- বিভিন্ন প্রকার মেটাবলিক ডিজিজ ঘেমন; ফ্যাটিলিভার ডিজিজ, লিভার ডিজেনারেশন, অ্যাসাইটিস প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে
- খাদ্য গ্রহণে অনীহা দূর করে
- খাদ্য রংপুর হার (FCR) উন্নীত করে
- অ্যাটামিক গ্রুপ (Antibiotics, Sulfonamides) ব্যবহারের সময় ও পরে বিভিন্ন ধরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে
- গবাদি প্রাণীর ফ্যাসিও লিয়াসিসের চিকিৎসাকালীন সময়ে এবং এর পরে ব্যবহৃত হয়
- প্রাণীর যে কোন ধৰ্ম তে প্রেরণ করে পরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অন্যান্য প্রয়োগযোগ্য ও প্রয়োগবিধি

নাভাটন ভেট খাবার পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হয়।

ইংস মুরগি: ১-২ মি.লি. প্রতি লিটার পানিতে।

গরু ও ঘোড়া: ২০-৫০ মি.লি. প্রতি লিটার পানিতে।

বাছুর, ছাঁচাল ডেড়ো: ৫-১০ মি.লি. প্রতি লিটার পানিতে।

মাছ ও চিপিডি: প্রতি কেজি খাদ্যে ৫ মি.লি.।

অধিবা বেজিটেস্ট ভেটেরোব্যার চিকিৎসাকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার।

#### পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

প্রস্তুতিবিত ডোজ এ কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

#### প্রত্যাহারকাল

মাংস, দ্রু ও ডিম: ০ (শূন্য) দিন।

সংরক্ষণ: ৩০°সে. তাপমাত্রার নিচে, আলো থেকে দূরে ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে

রাখুন।

সরববাহ

২৫ লিটার ড্রাম।

প্রস্তুতকরণ:  
**পলিমিক্স বি.ভি. হল্যাড**

নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ  
কলকাতা, কলকাতা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

 নাভানা ফার্মা  
ভেটেরিনারি ডিভিশন