

Agonil

Diethylamine
Salicylate BP 10%

Composition:

Agonil Cream: Each gram cream contains Diethylamine Salicylate BP 100 mg.

Pharmacology:

Diethylamine Salicylate is a topical analgesic, where Salicylate provide anti-inflammatory properties.

Indications:

For symptomatic relief of rheumatic and minor musculo-skeletal conditions including lumbago, fibrositis, sciatica, bruises and strains.

Dosage & Administration:

Apply three times daily to the affected area, massaging until cream is fully absorbed.

Contraindication:

Diethylamine Salicylate should not be used if the surface of the skin is broken.

Warnings & Precautions:

Consult your doctor before use if you are pregnant, breastfeeding, asthmatic or on any other medicines.

Side Effects:

Temporary skin reactions (redness, burning sensation and rashes) may occur.

Use in Pregnancy & Lactation:

Not safe in pregnancy and lactation.

Use in Children & Adolescents:

Not to be used on children under 6 years of age.

Drug Interactions:

Topical salicylates may potentiate the anticoagulant effects of warfarin. It is therefore advisable that caution should be exercised with patients who are on coumarin anticoagulants.

Overdosage:

If applied to a large area of skin, or in the unlikely event of oral ingestion, the product may cause systemic adverse effects.

Common features include vomiting, dehydration, tinnitus, vertigo, deafness, and sweating increased respiratory rate and hyperventilation.

Storage:

Store below 30°C, away from light and in a dry place. Keep all medicines out of reach of children.

Packing:

Agonil Cream: Each box has a laminated tube containing 30 g cream and an insert.

Manufactured by:
Navana Pharmaceuticals PLC.
Rupshi, Rugganj, Narayanganj, Bangladesh
NCLT0786_11-24_01

 **NAVANA PHARMA**

এগোনিল ক্রীম

ডাইইথাইলঅ্যামিন
স্যালিসাইলেট বিপি ১০%

উপাদান:

এগোনিল ক্রীম: প্রতি গ্রাম ক্রীমে রয়েছে ডাইইথাইলঅ্যামিন স্যালিসাইলেট বিপি ১০০ মি.গ্রা.।

ফার্মাকোলজি:

ডাইইথাইলঅ্যামিন স্যালিসাইলেট ক্রীম একটি টপিকাল অ্যানালজেসিক এবং যেখানে স্যালিসাইলেটের প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

নির্দেশনা:

লাম্বাগো, ফাইব্রোসাইটিস, সায়টিকা, ক্ষত এবং স্ট্রেনসহ রিউম্যাটিক এবং যৎসামান্য মাসকিউলো-স্কেলেটাল লক্ষণগত সমস্যার উপশমের জন্য।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:

প্রতিদিন তিনবার আক্রান্ত স্থানে ক্রীমটি প্রয়োগ এবং মাসাজ করতে হবে, যতক্ষণ না ক্রীম সম্পূর্ণরূপে মিশে যায়।

প্রতিনির্দেশনা:

ফেটে যাওয়া ত্বকে ডাইইথাইলঅ্যামিন স্যালিসাইলেট ব্যবহার করা উচিত নয়।

সাবধানতা ও সতর্কতা:

আপনি যদি গর্ভবতী হন, বুকের দুধ খাওয়ান, হাঁপানি বা অন্য কোনো ওষুধ সেবন করে থাকেন তবে ব্যবহার করার পূর্বে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে নিন।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:

অস্থায়ী ত্বকের প্রতিক্রিয়া (লালাভাব, জ্বালাপোড়া এবং ফুসকুড়ি) হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার:

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার নিরাপদ নয়।

শিশু ও বয়ঃসন্ধিকালীন ব্যবহার:

৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

অন্য ওষুধের সাথে ক্রিয়া:

টপিকাল স্যালিসাইলেটগুলি ওয়ারফেরিনের অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট এর কার্যকারিতা বাড়াতে পারে। তাই কুউমারিন অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট সেবনকারী রোগীদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

অতিমাত্রা:

যদি ত্বকের একটি বৃহৎ যায়গায় এটি প্রয়োগ করা হয় বা তুলে মুখে খাওয়ার ক্ষেত্রে ওষুধটি সিস্টেমিক সার্কুলেশনে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে বমি, ডিহাইড্রেশন, টিনিটাস, ভারিগো, বধিরতা এবং ঘাম, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বৃদ্ধি এবং হাইপারভেন্টিলেশন।

সংরক্ষণ:

৩০°C. তাপমাত্রার নিচে, আলো থেকে দূরে ও শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করুন। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

মোড়ক:

এগোনিল ক্রীম: প্রতিটি ব্যাগে রয়েছে ৩০ গ্রাম ক্রীমের একটি লেমিনেটেড টিউব এবং একটি নির্দেশিকা।

প্লেজ্ঞতকারক:

নানানা ফার্মাসিউটিক্যালস্ পিএলসি.
রূপসী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

 **নানানা ফার্মা**