

# Loteba™

Loteprednol Etabonate 0.5%  
& Tobramycin 0.3%

## Sterile Eye Suspension

### Description

Loteprednol Etabonate is a sterile multiple dose topical anti-inflammatory corticosteroid and Tobramycin is antibiotic. Loteprednol Etabonate is structurally similar to other corticosteroid. It is highly lipid soluble which enhances its penetration into cells.

### Composition

**Loteba™ Sterile Eye Suspension:** Each ml contains Loteprednol Etabonate INN 5 mg and Tobramycin USP 3 mg.

### Indications

**Loteba™** is indicated for steroid responsive inflammatory ocular conditions for which a corticosteroid is indicated and where superficial bacterial ocular infection or a risk of bacterial ocular infection exists. The use of a combination drug with an anti-infective component is indicated where the risk of superficial ocular infection is high, where dangerous number of bacteria will be present in the eye.

### Dosage and administration

Shake the bottle well before use

Apply 1 to 2 drops of **Loteba™** into the conjunctival sac of the affected eye (s) every 4 to 6 hours. During the initial 24 to 48 hours, the dosing may be increased, to every 1 to 2 hours. Frequency should be decreased gradually as warranted by improvement in clinical signs. Care should be taken not to discontinue therapy prematurely or as directed by the physician.

### Side effects

Prolong use may increase IOP which may be associated with possible development of glaucoma and frequent optic nerve damage, posterior sub-capsular cataract formation and perforation of the globe where there is thinning of cornea or sclera. The most frequent adverse reactions to topical Tobramycin are hypersensitivity and localized ocular toxicity including lid itching and swelling and conjunctival erythema.

### Precautions

Patient should not wear soft contact lenses when using this drug. The possibility of fungal infections of the cornea should be considered after long term steroid dosing. The use of steroids after cataract surgery may delay healing. If super infection occurs, appropriate therapy should be initiated.

### Contraindications

This drops as with other steroid anti-infective ophthalmic combination drugs, is contraindicated in most viral diseases of the cornea and conjunctiva including epithelial herpes simplex keratitis. It is also contraindicated in mycobacterial infection in the eye and fungal diseases of ocular structures.

### Drug interaction

No information is available.

### Use in pregnancy and lactation

**Pregnancy:** Pregnancy category C. There is no adequate and well controlled studies in pregnant women. It should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus.

**Lactation:** It is not known whether topical ophthalmic administration of corticosteroids could result in sufficient systemic absorption to produce detectable quantities in human milk. Caution should be exercised when it is administered to nursing women.

### Use in pediatric

Safety and effectiveness in pediatric patients have not been established.

### Pharmaceutical precautions:

Keep all medicines out of the children's reach. Should be dispensed only on the prescription of a registered physician. Close the dropper immediately after use. Do not use for longer than one month after opening the dropper.

### Commercial supply

**Loteba™ Sterile Eye Suspension:** Each plastic dropper bottle contains 5 ml Sterile Eye Suspension and an insert.

Manufactured by:

**Navana Pharmaceuticals Ltd.**  
Rupshi, Rupganj, Narayanganj, Bangladesh  
NCLT0481-04-18-02

 **NAVANA PHARMA**  
PHARMACEUTICALS

# লোটোবা™

লোটোপ্রেডনল ইটাবোনট ০.৫%  
এবং টোব্রামাইসিন ০.৩%

## জীবাণুমুক্ত চোখের সাস্পেনশন

### বিবরণ

লোটোপ্রেডনল ইটাবোনট হলো বহুমাত্রার বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য জীবাণুমুক্ত কটিকোস্টেরয়েড এবং টোব্রামাইসিন হলো এন্টিবায়োটিক। লোটোপ্রেডনল ইটাবোনট এর গঠন অন্যান্য কটিকোস্টেরয়েডের দৃশ্য। এটি লিপিতে অত্যন্ত দ্রবণীয় যার ফলে খুব দ্রুত কোষে প্রবেশ করতে পারে।

### উপাদান

**লোটোবা™ জীবাণুমুক্ত চোখের সাস্পেনশন** প্রতি মি.লি. এর রয়েছে লোটোপ্রেডনল ইটাবোনট আইএনএন ৫ মি.গ্রা. এবং টোব্রামাইসিন ইউএসপি ৩ মি.গ্রা।

### নির্দেশনা

**লোটোবা™** স্টেরয়েড সংবেদী চোখের প্রদাহে যেখানে কটিকোস্টেরয়েড নির্দেশিত এবং যেখানে সুপারফিসিয়াল ব্যাকটেরিয়া জনিত চোখের সংক্রমণ অথবা সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। যেখানে সংক্রমণের ঝুঁকি খুব বেশী অথবা যেখানে বিপদজনক সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া চোখে উপস্থিত থাকতে পারে বলে প্রত্যাশা করা হয় সেক্ষেত্রে এ্যান্টি ইনফেকটিভ সহ এই মিশ্রিত ওষুধ ব্যবহৃত হয়।

### মাত্রা ও ব্যবহার বিধি

ব্যবহারের পূর্বে বোতল ভালভাবে বাকিবে নিন।

১-২ ঘণ্টা করে **লোটোবা™** প্রতি ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা পর পর কনজাংটিভাল স্যাকে প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে প্রথম ২৪-৪৮ ঘণ্টার ভিতরে মাত্রা বৃদ্ধি করা যেতে পারে প্রতি ১-২ ঘণ্টায়। ক্লিনিক্যাল নির্দেশের উদ্ভূতির সাথে ধীরে ধীরে মাত্রা কমাতে হবে। কোর্স সম্পূর্ণ করার পূর্বে যাতে চিকিৎসা বন্ধ না করা হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য।

### পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

দীর্ঘদিন স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে অন্তরাস্থিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়া সহ গ্লুকোমা, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, পোস্টেরিয়র সাবক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট এবং গ্লোবের যেখানে কর্ণিয়া অথবা স্কেলেরা সুরু হয়েছে সেখানে ছিদ্র হতে পারে। টোব্রামাইসিনের কারণে সবচেয়ে বেশী সংবেদনশীল এবং স্থানীয় বিকট্রিয়া যেমন চোখের পাতায় চুলকানি ও পাতা ফুলে যেতে পারে এবং কনজাংটিভা লাল হতে পারে।

### সাবধানতা

এই ওষুধ ব্যবহারের সময় রোগীদের নরম কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করা উচিত নয়। দীর্ঘদিন স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে কর্ণিয়াতে ছত্রাকের সংক্রমণের সম্ভাবনা বিবেচনা করা উচিত। ছানি অপারেশনের পর স্টেরয়েড ব্যবহারে ক্ষতস্থানের উপশম দেরী হতে পারে। যদি সুপারইনফেকশন ঘটে উপযুক্ত চিকিৎসা শুরু করা উচিত।

### প্রতিনির্দেশনা

এই ড্রপস্ অন্যান্য স্টেরয়েড এন্টি-ইনফেকটিভ অফথালমিক কমবিনেশন এর মতো কর্ণিয়া এবং কনজাংটিভার ভাইরাল সংক্রমণে এবং এপিথেলিয়াল হার্পিস সিমপ্লেক্স কেরাটাইটিসে প্রতিনির্দেশিত। এছাড়া মাইকোব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ এবং চোখের ফাংগাস সংক্রমণের ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত।

### অন্যান্য ওষুধের সাথে ক্রিয়া

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

### গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার

**গর্ভাবস্থায়:** এটি প্রেগনেসি ক্যাটাগরি সি। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও সনিয়ন্ত্রিত স্ট্যাডি না থাকায় যদি কেবলমাত্র গর্ভস্থ শিশুর ঝুঁকির তুলনায় সম্ভাব্য সুবিধার পরিমাণ বেশী হয় তাহলে ইহা গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত।

**স্তন্যদানকালে:** চোখে ব্যবহারের ফলে পরীক্ষা পরিমাণ সিস্টেমিক শোষণের মাধ্যমে মাতৃদুগ্ধে নির্ণেয় পরিমাণ কটিকোস্টেরয়েড উপস্থিত কিনা জানা যায়নি। স্তন্যদানকারী মহিলাদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

### শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

### ফার্মাসিউটিক্যাল সতর্কতা

সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের ব্যবস্থাপন অনুযায়ী বিতরণযোগ্য। ব্যবহারের পরপরই ড্রপারের মুখ বন্ধ করতে হবে। ড্রপারের মুখ খোলার এক মাস পর ওষুধটি ব্যবহার করবেন না।

### বাণিজ্যিক সরবরাহ

**লোটোবা™ জীবাণুমুক্ত চোখের সাস্পেনশন** প্রতিটি প্লাস্টিক ড্রপার বোতলে রয়েছে ৫ মি.লি. জীবাণুমুক্ত চোখের সাস্পেনশন এবং একটি নির্দেশিকা।

### প্রস্তুতকারক:

**নাবানা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ**  
রূপসী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

 **নাবানা ফার্মা**  
অফিস ইলেক্ট্রনিক্স