



Vitamin C BP 60 mg, Vitamin E BP 30 mg, Zinc BP 15 mg
Copper BP 2 mg & Lutein BP 6 mg

Composition:

Each capsule contains Ascorbic Acid BP (Vitamin C) 60 mg, Alpha Tocopheryl Acetate BP (Vitamin E) 30 mg, Zinc (as Zinc Oxide BP) 15 mg, Copper (as Cupric Oxide BP) 2 mg & Lutein BP 6 mg.

Pharmacology:

Vitamin C & Vitamin E work as antioxidants and they have free radicals scavenging property. Lutein protects macula from oxidative stress and the damage caused by light. Zinc works as co-enzyme of numerous enzymes. Copper involves in the growth, skeletal integrity and development of nervous system.

Indications:

Vitared™ is indicated for Age Related Eye Diseases (ARED) e.g. Age Related Macular Degeneration (ARMD) & cataract.

Dosage and Administration:

1-2 capsules/day or as directed by the physician.

Contraindication:

This product is contraindicated to the patients with known hypersensitivity to any ingredients of the drug.

Warnings & Precautions:

Vitamin C should be given with care to patients with hyperoxaluria. It is also to be given carefully to the patients taking oral Vitamin C & Vitamin E.

Side Effects:

Large dose of Vitamin C & Vitamin E cause diarrhoea and other gastrointestinal disturbances. Fatigue and weakness have also been reported.

Use in Pregnancy & Lactation:

It is recommended to consult the physician before using this drug during pregnancy and lactation.

Use in Children & Adolescents:

No information is available.

Drug Interaction:

This product should be given carefully in patients taking oral anticoagulants or estrogen. It has found to antagonize the effects of Vitamin K leading to an increase in blood clotting time in these patients.

Overdose:

No data available.

Storage:

Store below 30°C, away from light & in a dry place. Keep out of the reach of children.

Packing:

Each box contains 6 X 10 capsules in Alu-Alu blister pack and an insert.

Manufactured by:
Navana Pharmaceuticals Ltd.
Rupshi, Rupganj, Narayanjanj, Bangladesh



NCLT0661_01-22_01



ভিটামিন সি বিপি ৬০ মি.গ্রা., ভিটামিন ই বিপি ৩০ মি.গ্রা., জিংক বিপি ১৫ মি.গ্রা.
কপার বিপি ২ মি.গ্রা. এবং লুটিন বিপি ৬ মি.গ্রা.

উপাদান:

প্রতিটি ক্যাপসুলে রয়েছে এস্করবিক এসিড বিপি (ভিটামিন সি) ৬০ মি.গ্রা., আলফা টোকোফেরিল এসিটেট বিপি (ভিটামিন ই) ৩০ মি.গ্রা., জিংক (জিংক অক্সাইড বিপি হিসেবে) ১৫ মি.গ্রা., কপার (কিউপ্রিক অক্সাইড বিপি হিসেবে) ২ মি.গ্রা. এবং লুটিন বিপি ৬ মি.গ্রা.।

ফার্মাকোলজি:

ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ই এন্টিঅক্সিডেন্ট এবং ফ্রিরেডিক্যাল স্কাভেনজার হিসেবে কাজ করে। লুটিন চোখের ম্যাকুলাকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং আলোজনিত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। জিংক বিভিন্ন এনজাইমের কো-এনজাইম হিসেবে কাজ করে। কপার হাড়ের বৃদ্ধি এবং দৃঢ়তাকে বাড়িয়ে দেয়। ইহা নার্ভাস সিস্টেমের জন্যও দরকারী।

নির্দেশনা:

ভিটারেড™ চোখের বয়সজনিত বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন বয়সজনিত ম্যাকুলার ডিজেনারেশন, ক্যাটারাক্ট ইত্যাদিতে নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি:

প্রতিদিন ১-২ টি ক্যাপসুল অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য।

প্রতিনির্দেশনা:

এই ওষুধের কোনো উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়।

সাবধানতা এবং সতর্কতা:

হাইপারঅক্সালিউরিয়া আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে ভিটামিন সি সতর্কতার সাথে দিতে হবে। যে সব রোগী ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ই সেবন করে, তাদের ক্ষেত্রেও এটি সতর্কতার সাথে দিতে হবে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:

ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ই এর অধিক মাত্রা ডায়রিয়া এবং পরিপাকতন্ত্রের অন্যান্য রোগ ঘটতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে ক্লান্তি ও দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকালে ব্যবহার:

গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকালে ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শিশু এবং বয়ঃসন্ধিকালীন ব্যবহার:

কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:

যেসব রোগী এন্টিকোয়াগ্যান্ট অথবা ইস্ট্রোজেন সেবন করে, তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে দিতে হবে। ইহা ভিটামিন কে এর কাজকে প্রভাবিত করে, ফলে রক্ত জমাট বাধার সময় বাড়িয়ে দেয়।

অতিমাত্রা:

কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

সংরক্ষণ:

৩০°সে. তাপমাত্রার নিচে, আলো থেকে দূরে ও শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করুন। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

মোড়ক:

প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ৬ X ১০টি ক্যাপসুল অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে এবং একটি নির্দেশিকা।

প্রস্তুতকারক:

নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড
রূপসী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

